

АКАРОСТОП
(розчин для зовнішнього застосування)
листівка-вкладка

Опис

Розчин у вигляді маслянистої рідини безбарвного або жовтуватого кольору із специфічним запахом.

Склад

1 ml (мл) препарату містить діючу речовину:
амітраз - 3,0 mg (мг).

Допоміжні речовини: диметилсульфоксид, поліетиленгліколь-400.

Фармакологічні властивості

АТС VET QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AD01, амітраз)

Амітраз – акарицид системної і контактної дії, який блокує октопамінергічні рецептори кліщів, що призводить до порушень функцій нервової системи і далі до паралічу і загибелі паразитів. Амітраз активний щодо личинкових і статевозрілих фаз розвитку кліщів (*Otodectes cynotis*, *Psoroptes cuniculi*, *Sarcoptes* spp., *Notoedres* spp., *Demodex* spp.).

Препарат ефективний щодо популяцій кліщів, стійких до хлор- і фосфорорганічних інсектицидів, проникає і депонується в епідермісі, волоссяних цибулинах, жирових та потових залозах тварини. Диметилсульфоксид має протизапальну, бактерицидну і пом'якшувальну дії і сприяє загоєнню пошкоджених тканин.

Застосування

Лікування собак, котів, кролів, хутрових звірів при отодектозі, псороптозі, саркоптозі, нотоєдрозі, демодектозі.

Дозування

При отодектозі закапують по 2-3 краплі препарату у зовнішні слухові проходи обох вух (навіть при ураженні лише одного). Попередньо слухові проходи очищають від струпів та кірок тампоном, змоченим препаратом, для повної обробки поверхні вуха, вушну раковину складають вздовж навпіл і легко масажують. Обробку проводять один раз на добу до зникнення клінічних ознак захворювання (6-8 обробок).

При демодектозі, саркоптозі, нотоєдрозі та псороптозі препарат наносять за допомогою ватно-марлевого тампону тонким шаром на попередньо очищені від поверхневих струпів і кірок уражені ділянки шкіри, від периферії до центру із розрахунку 0,5 ml (мл) на 1 kg (кг) маси тіла тварини. Обробку проводять 6-8 раз один раз на добу, до зникнення клінічних ознак захворювання, інтервал між обробками 2-3 доби. Додатково обробляють здорову шкіру навколо уражених ділянок, шириною не менше 1 cm (см).

Протипоказання

Не застосовувати препарат хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати тваринам з індивідуальною підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Не застосовувати вагітним та лактуючим самкам!

Не застосовувати цуценятам та кошенятам віком до 2 місяців!

Застереження

Не допускати злизування препарату тваринами після обробки та уникати попадання препарату в очі та на слизові оболонки. Препарат подразнює слизові оболонки.

При роботі з препаратом дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Забороняється палити, пити та приймати їжу під час роботи з препаратом. Після роботи препаратом ретельно вимити руки з милом.

Форма випуску

Полімерні флакони з крапельницею по 10 ml (мл) в картонних коробках.

Зберігання

Зберігати препарат у сухому, темному недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 4 до 25°C.

Термін придатності

3 роки.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»,

вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна.

+38(057) 766-36-36

Виробник готового продукту

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна.

info@provet.ua

provet.ua